

# Läkemedelslista till patient

Huvudmeningen med en läkemedelslista är att den ska vara korrekt. Det ska vara tydligt och klart för varje patient vilka läkemedel och vilka doser denna är ordinerad.

- Läkemedelslistan ska skrivas ut från NYA Cosmic. Den ska skrivas under av ansvarig läkare
- Insulinordinationer ska vara tydliga



# OBS! Läkemedel som är obedomda kommer inte med på läkemedelslistan vid utskrift.

Läkemedel 20 160034-4707 \* Testare, Testa

Läkemedelslista Utdelningswv Receptöversikt Vaccinationslista Nutritionsprodukter Förbrukningsartiklar Ny...

Varningar: \* \* \* Information från dos...

Presentationsläge: Liten Mellan Stor Sortera lista enligt: ATC kod

2016 2017  
sep nov jan mar maj

**Aktuella läkemedelsbehandlingar**

	NovoRapid FlexPen, 100 E/ml	4 E +6 E +8 E +0 E tv	Σ	▼					
	Trombyl, 75 mg	1 tablett x 1tv	Σ	▼					
	Candesartan Krka, 8 mg	1 tablett x 1tv	Σ	▼					
	Panodil, 500 mg	1-2 tabletter x 1-4 max8/d tv	Σ	▼					
	Sertralin Actavis, 50 mg	1 tablett x 1tv	Σ	▼					

**Vid behov [1]**

	Citodon, 500 mg/30 mg	1-2 tabletter vb max8/d tv	Σ	▼					
--	-----------------------	----------------------------	---	---	--	--	--	--	--

**Avslutade läkemedelsbehandlingar [8]**

**Obedömda behandlingar (3)**

	Ordination	Dosering	Insättn. datum	Utsättn. datum
<input type="checkbox"/>	Airomir Inhalationsspray, suspension 0.1 mg/dos	1-2 inhalationer vid behov. Max 8 inhalationer per dygn.	2016-12-05	Tills vidare
<input type="checkbox"/>	Ventoline® Lösning för nebulisator 5 mg/ml	1 inhalation 12 gånger per dygn Vid behov.	2016-12-05	Tills vidare
<input type="checkbox"/>	Flutide® Diskus® Inhalationspulver, avdelad dos 50 mikrog/dos	1 inhalation 2 gånger dagligen	2016-12-05	Tills vidare

**DETTA ÄR DINA AKTUELLA LÄKEMEDEL**  
Ta alltid med denna vid besök hos läkare eller på apotek.  
Ska inte förväxlas med apotekets lista över sparade recept.

Läkemedelslista för  
201600344707  
TestaTestare

Listan gäller från 2017-09-11 (kasta den gamla listan)

Insatt fr o m	Utsatt	Läkemedel (verksamt ämne)	Dosering	Information	Morgon	Lunch	Middag	Kväll
2017-05-31		<b>Novorapid Flexpen 100 E/ml</b> (insulin aspart (FlexPen)) Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna	4 E till frukost, 6 E till lunch och 8 E till middag tills vidare Subkutan Injection	Snabbverkande insulin vid diabetes				
2017-05-31		<b>Trombyl 75 mg</b> (acetylsalicylsyra) Tablett	1 tablett 1 gång dagligen tills vidare	Förebygger blodpropp				
2017-09-11		<b>Candesartan 8 mg</b> (kandesartan) Tablett	1 tablett 1 gång dagligen tills vidare	Mot förhöjt blodtryck Se Observera nedan!				
2017-06-14		<b>Panodil 500 mg</b> (paracetamol (grupp A)) Tablett	1-2 tabletter 1-4 gånger dagligen högst 8 tabletter per dygn tills vidare	Smärta				
2017-05-16		<b>Sertralin 50 mg</b> (sertralin) Tablett	1 tablett 1 gång dagligen tills vidare	Mot depression				

Här kan man skriva in  
om det är en särskild  
läkare/mottagning som  
ansvarar för  
medicineringen

**Läkemedel vid behov**

Insatt fr o m	Utsatt	Läkemedel (verksamt ämne)	Dosering	Information	Morgon	Lunch	Middag	Kväll
2017-06-14		<b>Citodon 500 mg/30 mg</b> (paracetamol + kodein) Tablett	1-2 tablett vid behov, högst 8 tabletter per dygn tills vidare	Mot värk. Minsta tid mellan doser 6 tim OBS maxdos av paracetamol får EJ överskridas vid kombinationsbehandl				

**DETTA ÄR DINA AKTUELLA LÄKEMEDEL**  
**Ta alltid med denna vid besök hos läkare eller på apotek.**  
**Ska inte förväxlas med apotekets lista över sparade recept.**

Listan gäller från 2017-09-11 (kasta den gamla listan)

Läkemedelslista för  
201600344707  
TestaTestare

OBSERVERA! Om du blir uttorkad pga feber, kräkning och eller diarré, om du får svårt att äta eller dricka ska du göra uppehåll med följande mediciner: Candesartan.  
När du tillfrisknat kan du börja med medicinerna igen. Om du är sjuk längre än tre dagar kontakta din behandlande läkare.

Datum: \_\_\_\_\_ Ansvarig läkare: \_\_\_\_\_ Sign: \_\_\_\_\_